BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 23 mars 1910.

Présidence de M. Maurice MAINDRON.

MM. A. Méquignon (de Vendôme) et F.-L. Washburn, entomologiste d'État à St-Anthony-Park (États-Unis d'Amérique), assistent à la séance.

Correspondance. — MM. A. Argod, J. Bourgeois, H. Cambournac, A. Degors, L. Dupont, Ch. Ferton, H. Gadeau de Kerville le Dr R. Jeannel, J. Lascols, A. Méquignon, M. Nibelle, L. Saintout, et G. Sérullaz se sont fait inscrire comme devant prendre part au Congrès de 1910.

Changement d'adresse. — M. P. Wytsmann, Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren (près Bruxelles).

Admission. — M. le baron Michel Tossizza, 15, rue de Lubeck, Paris, 16e. *Lépidoptères du globe.*

Communications.

Description d'une espèce nouvelle de *Theodosia* [Col. Scarabaeidae]

par A. Bourgoin.

Theodosia Maindroni, n. sp. — ♂. Tête rugueusement couverte de gros points irréguliers portant des soies courtes, un peu plus longues sur le front et derrière les yeux. Côtés de la tête relevés en rebord mince plus saillant en avant et formant une dent de chaque côté de l'épistome. La corne céphalique est brillante, d'un vert cuivreux

et finement ponctuée en avant; elle est prismatique à section triangulaire vers les deux tiers de sa hauteur, rétrécie en pointe à l'extrémité par une troncature du prisme à la partie dirigée en arrière qui est assez fortement ponctuée et parsemée de petites soies grisâtres. Pronotum vert-bronzé assez brillant au milieu et sur la saillie antérieure, qui ne dépasse guère le devant des yeux; surface alutacée au milieu du disque avec ponctuation double : points fins entremêlés de gros points ocellés enfoncés, d'un diamètre égal à trois ou quatre fois celui des petits. Cette ponctuation devient confluente vers les déclivités qui sont rugueuses. Rebord latéral brillant et bien marqué depuis les angles postérieurs jusqu'au milieu de la longueur.

Scutellum densément et finement ponctué. Élytres vert jaunâtre, alutacés, à ponctuation fine, dense et régulière.

Pygidium et dessous du corps densément ponctués, couverts d'une pubescence uniforme, blanchâtre, assez serrée excepté au milieu du mésosternum qui est brillant et marqué d'un sillon. Fémurs très densément ponctués, concolores; tibias et tarses cuivreux.

♀. Vert bronzé cuivreux uniforme en dessus comme en dessous; ou bien dessus du pronotum et scutellum bruns, peu métalliques, élytres brun clair non métalliques et dessous vert cuivreux. Tête fortement ponctuée, à points ocellés plus gros et plus espacés sur les côtés, portant des soies dressées jaunâtres, plus abondantes sur le front entre les yeux.

Pronotum finement alutacé avec de gros points enfoncés plus rapprochés vers les côtés qui sont pourvus, de la base au sommet, d'un rebord plus luisant, moins ponctué, large en arrière, devenant bien plus étroit en avant à partir du milieu. Scutellum presque lisse; élytres densément ponctués portant quelques soies sur leur déclivité postérieure. Pygidium et abdomen à pubescence bien moins dense que chez le mâle; avant-dernier segment abdominal à soies rousses dirigées en arrière; segments abdominaux ponctués de signes arqués confluents sur les côtés où ils ont l'apparence de stries courtes et irrégulières.

Longueur ♂ et ♀ : 19 à 20 mill., tête non comprise; largeur aux épaules ♂ : 10 mill. ♀ : 9.5.

Sumatra, Médan.

Un ♂ et une ♀, coll. Maindron; un ♂, et une ♀ coll. Bourgoin.